

1807
Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Giessen.

ÜBER
SÄTTIGUNG DES TIERKÖRPERS
MIT CHLOROFORM
WÄHREND DER NARKOSE.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

PAUL DUNKER

approb. Tierarzt aus Hannover.

Mit einer Abbildung.

GIESSEN 1907

von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei (O. Kindt).

Aus dem Pharmakologischen Institut der Universität Giessen.

ÜBER
SÄTTIGUNG DES TIERKÖRPERS
MIT CHLOROFORM
WÄHREND DER NARKOSE.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der

veterinär-medizinischen Doktorwürde

der

vereinigten medizinischen Fakultät

der

Grossherzoglich Hessischen Ludwigs-Universität zu Giessen

vorgelegt von

PAUL DUNKER

approb. Tierarzt aus Hannover.

Mit einer Abbildung.

GIESSEN 1907

von Münchow'sche Hof- und Universitäts-Druckerei (O. Kindt)

Gedruckt mit Genehmigung der vereinigten medizinischen Fakultät.

Referent: Prof. Dr. Geppert.

MEINEN LIEBEN ELTERN

GEWIDMET.



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA40154004_0272

Durch P. Berts Untersuchungen über die Narkose ist festgestellt, daß die Betäubung abhängig ist von dem Partiardruck des betäubenden Dampfes in der Einatemungs-luft. Erst wenn dieser eine bestimmte Höhe erreicht, tritt der Schlaf ein. Nimmt man an, daß der Körper einen bestimmten Gehalt des Narkotikums aufweisen muß, damit die Betäubung eintritt, so würde sich als Konsequenz ergeben, daß zwischen Inspirationsluft und Körper ein Ausgleich eintritt. Es würde einem bestimmten Gehalte der Inspirationsluft an Chloroformdampf etc. auch ein bestimmter Gehalt des Körpers entsprechen. Der Körper würde sich verhalten wie Wasser oder eine andere Flüssigkeit, die mit dem betreffenden Dampfgemisch solange geschüttelt ist, bis sie sich für den Partiardruck des betreffenden Dampfes gesättigt hat. Ob diese Anschauung für den Körper streng zutrifft, läßt sich auf Grund analoger Betrachtungen untersuchen. Wenn man nämlich eine für ein bestimmtes Dampfgemisch gesättigte Wassermenge weiter damit behandelt, so verliert dasselbe keinen Dampf mehr und zeigt analytisch die Zusammensetzung des ursprünglichen Dampfgemisches. Eine analoge Untersuchung läßt sich am Körper anstellen. Der Ort, an welchem das eingeatmete Dampfgemisch mit den körperlichen Geweben in Berührung tritt, ist die Lunge. Bei der Atmung nimmt das Blut den narkotifizierenden Dampf auf und das ausgeatmete Gas wird daher zunächst dampfärmer austreten; mit anderen Worten, die ausgeatmete Luft wird einen geringeren Gehalt an narkotifizierendem Dampf aufweisen als die einge-

atmete. Das Blut tritt nun feinerseits wieder in Ausgleich mit den Geweben und kehrt daher dampfärmer in die Lungen zurück, um dort von neuem das Narkotikum aufzunehmen etc. Zum Schluß wird dann ein Moment kommen, in welchem Blut und Gewebe für den betreffenden Partiardruck des Narkotikums abgefättigt sind, und dann müßte die Expirationsluft den gleichen Gehalt an Narkotikum zeigen, wie die Inspirationsluft.

Nun ist von vornherein zuzugeben, daß die Anschauung nicht notwendigerweise absolut richtig zu sein braucht. Wird nämlich in den Geweben ein mehr oder minder großer Teil des Narkotikums zerstört, so würde ein voller Ausgleich zwischen ihm und dem arteriellen Blute nicht stattfinden können, sondern die Gewebe würden stets eine niedrigere Dampfspannung zeigen als das arterielle Blut, und das venöse Blut würde stets dampfärmer in die Lungen einströmen. Es würde daher niemals die Expirationsluft die gleiche Zusammensetzung aufweisen wie die Inspirationsluft.

Aus den bis jetzt angestellten Betrachtungen geht hervor, daß eine Analyse der Expirationsluft bei Atmung eines bestimmten narkotisierenden Gemisches nach mehreren Richtungen hin Aufschlüsse zu geben vermag. Erstens muß sich zeigen, ob wirklich eine Abfättigung des Körpers für den betreffenden Partiardruck des narkotisierenden Gemisches stattfindet und zweitens würden sich daraus Schlüsse ziehen lassen, ob und in welchem Umfange eine Zerstörung des Narkotikums im Körper erfolgt.

Allerdings war von vornherein klar, daß, auch wenn man mit der Möglichkeit einer Abfättigung des Körpers rechnet, dieser Vorgang lange Zeit in Anspruch nehmen würde. Denn da eine Anzahl von Körperregionen vom Blut nur mäßig durchströmt wird, so wird ihre Abfättigung sehr langsam vor sich gehen und das ihnen entströmende Blut wird lange Zeit einen relativ niedrigen Gehalt an Narkotikum aufweisen. Es müssen daher die Versuche

von vornherein so eingerichtet werden, daß das gleiche narkotisierende Dampfgemisch lange Zeit hintereinander geatmet werden kann. Denn sobald atmosphärische Luft oder ein anderes Dampfgemisch, wenn auch nur kurze Zeit geatmet wird, so befreit sich das Blut in den Lungen von Chloroform etc. und die Abfättigung muß gewissermaßen von vorne beginnen. Weiterhin war von vornherein klar, daß, wenn man so lang dauernde Experimente in Aussicht nimmt, der Dampfdruck des Narkotikums in der Einatemungsluft relativ niedrig gestellt werden muß, da ein höherer binnen zu kurzer Zeit den Tod herbeiführen würde.

Von den bis jetzt bekannten Narkoticis eignet sich das Chloroform für eine derartige Untersuchung am besten, da seine Bestimmung relativ leicht ausführbar und sehr scharf ist. Ferner ist es geglückt, den Prozentgehalt der Luft an Chloroformdampf sehr genau einzustellen, wie es für die vorliegenden Untersuchungen notwendig ist.

Gelegentlich anderer Untersuchungen über die Chloroformnarkose sind bereits von Hölfcher¹⁾ und Günter²⁾ einige Bestimmungen der Expirationsluft bei Einatmung eines bestimmten Chloroformdampfgemisches aufgestellt worden. Hölfcher fand folgende Resultate:

Verfuch No.	Dauer der Chloroform- atmung	% Gehalt der In- spirationsluft	% Gehalt der Ex- spirationsluft	% Gehalt der Inspirationsluft zur Expirationsluft
1	40 '	0,88—1,0		
2	35 '	0,92—1,03	0,98	99
3	35 '	0,86—0,98	0,80	85
4	30 '	0,86—0,94	0,83	92
5	60 '	0,86—0,94	0,77	85

¹⁾ Hölfcher, Chloroformgehalt von Blut und Gehirn während der Narkose. Gießen 1906. Inaugural-Differtation.

²⁾ Günter, Chloroformgehalt von Blut, Leber und Niere während der Narkose. Gießen 1906. Inaugural-Differtation.

Günter fand folgende Resultate:

Verfuch No.	Dauer der Chloroform- atmung	% Gehalt der In- spirationsluft	% Gehalt der Ex- spirationsluft	% Gehalt der Inspirationsluft zur Exspirationsluft
1	50 '	0,81—0,85	0,66	80
2	55 '	" "	0,65	76
3	60 '	" "	0,67 u. 0,71	80 u. 86
4	71 '	" "	0,68 u. 0,7	82 u. 84
5	65 '	" "	0,65 u. 0,73	78 u. 88

Nach diesen Ziffern wäre binnen etwa einer Stunde eine vollkommene Ablättigung des Körpers der Regel nach noch nicht erreicht, doch würde immerhin der Gehalt der Ausatemungsluft an Chloroformdampf 80—90 % der Einatemungsluft betragen ¹⁾. Es war demnach zu untersuchen, ob man nach längerem Narkotifizieren die Ablättigung des Körpers noch weiter zu erhöhen vermag.

Die Methode meiner Untersuchungen schloß sich der von Höflicher und Günter an, nur musste auf die größtmögliche Konstanz der Zusammensetzung der Inspirationsluft hingearbeitet werden. Das Prinzip ist folgendes: In einem Apparat wird das Chloroformdampfgemisch hergestellt und durchströmt kontinuierlich einen großen Blechzylinder, der sich damit vollkommen füllt. Das Tier ist tracheotomiert und atmet durch Ventile. Der Einlaß des Inspirationsventiles reicht bis tief in den genannten Blechzylinder hinein, so daß das Tier aus ihm seine Atemluft schöpfen muß. Hinter das Expirationsventil ist eine Flasche gelegt, welche von der ausgeatmeten Luft durchströmt wird. Ihr Inhalt ist ausgemessen und die Analyse des darin enthaltenen Gasgemisches ergibt den Chloroformgehalt der

¹⁾ Ob der einzige Wert von 99 % bei Günter ganz zuverlässig ist, ist fraglich, da die Schwankung im Chloroformgehalt der Inspirationsluft 10 % des Werts beträgt (0,92—1,03 %).

ausgeatmeten Luft. Im einzelnen stellt sich die Methode folgendermaßen dar:

Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich ist, sind zunächst scharfe Chloroformbestimmungen der Luft das erste Erfordernis für vorliegende Untersuchungen. Die Methode ist bereits in den früheren Arbeiten aus dem pharmakologischen Institute l. c. geschildert. Sie beruht kurz auf folgendem: Der Chloroformdampf einer gemessenen Menge Luft wird durch Alkohol absorbiert und alsdann in chlorfreier alkoholischer Natronlauge verseift. Letztere wird hergestellt durch Auflösen von Natrium in Alkohol und zwar werden auf 100 ccm Alkohol 3 g Natrium verwandt. Die Flaschen, in denen die Luft aufgefangen wurde, enthielten ungefähr 0,015 bis 0,045 g Chloroform. Absorbiert wurde jedesmal mit 20 ccm 95% Alkohol und die Flasche mit 15 ccm Alkohol nachgespült. Zur Verseifung wurde mit 15 ccm 3% Natriumalkoholats am Rückflußkühler 30 Minuten lang erhitzt und zum Schluß der Alkohol abdestilliert. Als dann wurde mit Salpetersäure genau neutralisiert (sowohl gegen Lackmus wie gegen Phenolphthalein) und dann mit $\frac{1}{10}$ Normalsilberlösung und chromsaurem Kali als Indikator titriert. Auch ich habe mich davon überzeugt, daß die Bestimmungen sehr genau waren. Die Kontrolle wurde folgendermaßen vorgenommen. Ein aus einem dünnen Glasrohr gezogenes, kurzes, feines Kapillarröhrchen wird in der Mitte zu einer geringen Ausbuchtung aufgeblasen und an einem Ende zugeschmolzen. Es wird zunächst leer gewogen, alsdann mit Chloroform gefüllt. Zu dem Zweck wird es in ein Ragenzglas mit Chloroform geworfen, das kurz aufgeköcht und dann abgekühlt wird. Diese Prozedur wiederholt man so lange, bis sich die Kapillare fast ganz mit Chloroform gefüllt hat. Sind noch Luftblasen in der Kapillare, so stößt man sie mit dem zugeschmolzenen Ende leicht auf eine Unterlage auf, bis die Luftblasen emporgestiegen sind. Nun wiegt man die Kapillare wieder, wirft sie

in einen mit einer gemessenen Alkoholmenge angefüllten Meßzylinder, zerstückt sie vorsichtig mit einem Glasstab bringt alsdann das Gemenge in einer Erlenmeier'schen Kolben, spült mit Alkohol nach und fügt 15 ccm 3⁰/₁₀ Natriumalkoholats hinzu etc.

Meine Versuche hatten nun folgende Resultate:

Verwandt wurden 100 ccm Alkohol und zur Verseifung 25 ccm 3⁰/₁₀ Natriumalkoholats; im Rückflußkühler 30 Minuten gekocht.

I. Versuch.

Angewandtes Chloroform 0,0225

Gefundenes Chloroform 0,0210 (5,3 ccm ¹/₁₀ Normal-Silbernitrat-Lösung)

Verlust 0,0015

II. Versuch.

Angewandtes Chloroform 0,0120

Gefundenes Chloroform 0,0120 (3 ccm ¹/₁₀ Normal-Silbernitrat-Lösung)

Verlust 0

III. Versuch.

Angewandtes Chloroform 0,0138

Gefundenes Chloroform 0,0138 (3,45 ccm ¹/₁₀ Normal-Silbernitrat-Lösung)

Verlust 0

IV. Versuch.

Angewandtes Chloroform 0,0189

Gefundenes Chloroform 0,0188 (4,7 ccm ¹/₁₀ Normal-Silbernitrat-Lösung)

Verlust 0,0001

V. Versuch.

Angewandtes Chloroform 0,01975

Gefundenes Chloroform 0,0196 (4,9 ccm ¹/₁₀ Normal-Silbernitrat-Lösung)

Verlust 0,00015

VI. Versuch.

Angewandtes Chloroform 0,013

Gefundenes Chloroform 0,0128 (3,2 ccm ¹/₁₀ Normal-
Silbernitrat-Lösung

Verlust 0,0002

Aus diesen Bestimmungen geht hervor, daß in der Tat das gesamte Chloroform durch die Methode wieder gefunden wird.

Der Apparat, dessen ich mich zur Erzeugung des Chloroformdampfes bediente, war bereits von Günter und Höflicher angewandt; jedoch erfuhr er noch einige Aenderungen, welche den Zweck hatten, ein möglichst genau gestelltes Chloroformdampfgemisch zu produzieren (s. die Abbildung). Ein Ventilator, wie er zum Anblasen von Schmiedefeuern üblich ist, wird durch einen Elektromotor von einer Pferdekraft angetrieben. Der Elektromotor hat konstante Tourenzahl. Der Luftstrom wird durch eine breite Schlauchleitung ohne Knickungen zu einem Gasmeßer geführt. Passiert ihn der Luftstrom, so dreht sich seine Axe; diese Drehung löst automatisch den Zusatz des Chloroformdampfes zum Luftstrom aus und zwar in folgender Weise:

Die Axe der Gasuhr durchbohrt ihre hintere Wand. Dort ist ein Zahnrad aufgesetzt, welches ein größeres in Gang setzt. Die Axe des größeren Zahnrades ist mit einem Schraubengewinde versehen, von dem sich eine Schnur, resp. ein mit Seide umponnener feiner Kupferdraht abwickelt; er läuft an der Decke über zwei Rollen und endet in einen Stab, der in einem Rohr hängt. Geht die Gasuhr, so sinkt infolgedessen dieser Stab tiefer in das Rohr ein. Dieses Rohr hat einen seitlichen Ansaß, in den vermittels eines Korkes ein Knierohr eingefügt ist. Das Rohr wird mit Chloroform gefüllt, das sich in der Höhe der Umbiegungsstelle des Knierohres ein-

stellt. Sinkt der Stab, so wird Chloroform durch das Knierohr ausfließen und zwar genau soviel als der Stab verdrängt. Demnach muß auf jeden Liter Luft ein bestimmtes Quantum Chloroform ausfließen. Das untere Stück des Knierohres ist vermittle Korkes in ein kreuzförmiges Glasrohr eingesetzt. Der Luftstrom, der von der Gasuhr kommt, passiert die beiden queren Schenkel dieses Glasrohres. Der untere Schenkel ist verschlossen und steht in einem Leinölbad, das durch eine mit einem Thermoregulator versehene Gasflamme auf 125° gehalten wird. Bei dieser Anordnung tropft das Chloroform von oben aus dem Knierohr in den unteren Schenkel des Kreuzrohres und verdampft dort sofort, um sich alsdann dem Luftstrom beizumischen, der durch die beiden queren Kniefchenkel geht. Zwischen die Gasuhr und das genannte Kreuzrohr ist dann noch ein feiner Regulationshahn eingelegt. Sein Oeffnen und Schließen wird durch eine Schraube bewirkt und die Stellung des Hahnes kann an einer Skala abgelesen werden. Er ist hinter die Gasuhr eingelegt, um zu vermeiden, daß kleine Druckschwankungen, wie sie in der Gasuhr beim Uebergang von einer Kammer zur andern vorkommen, sich bis in das Kreuzrohr fortsetzen, was ein Schwanken des Chloroformzuflusses zur Folge haben könnte. Der mit dem Chloroformdampf gemischte Luftstrom, tritt alsdann in einen großen Blechzylinder von 30 Liter Inhalt von der einen Seite ein und durch zwei Öffnungen an der anderen Seite wieder aus. Ist der Apparat einige Zeit im Gange, so ist der Blechzylinder vollkommen mit Chloroformluft gefüllt. Die Einschaltung des großen Blechzylinders hat den Zweck, etwaige kleine Ungleichheiten der Chloroformdampfmischung der Luft auszugleichen. Aus ihm schöpft das tracheotomierte Tier die Luft bei der Einatmung durch das Inspirationsventil.

Für meine Versuche wurde der Apparat vermittle des Regulierhahnes so eingestellt, daß pro Minute etwa

20 Liter Luft hindurchgehen. Die von mir verwandten Tiere atmeten pro Minute höchstens 1 bis 6 Liter ein; es war daher von vornherein nicht zu befürchten, daß atmosphärische Luft in den Blechzylinder von außen hineingelogen würde, und es läßt sich auch direkt nachweisen, wenn man vor eine Ausströmungsöffnung des Blechzylinders ein Licht hält. Alsdann wird die Flamme konstant nach außen geweht.

Als Stab, welcher die Chloroformverdrängung bewirkt, wurde ein unten geschlossenes und mit Schrot beschwertes Messingrohr verwandt, da dieses überall einen genau gleichen Durchmesser besitzt. Bei diesen Vorsichtsmaßregeln tropft das Chloroform ungemein gleichmäßig aus dem Knierohr ab, und der Gang der Gasuhr ist ebenfalls ein außerordentlich regelmäßiger. Es läßt sich nun aus den gegebenen Daten berechnen, wie hoch der Prozentgehalt des Chloroformdampfes im Blechzylinder sein muß, und dann müssen diese theoretischen Werte mit den durch die Analyse gefundenen übereinstimmen. Die Berechnung beruht auf folgenden Daten:

Man stellt durch Ablefen an der Gasuhr fest, wieviel Liter Luft in einer bestimmten Zeit durch die Gasuhr gehen und ferner, wieviel ein Stab von bekanntem Durchmesser in das Chloroformrohr in derselben Zeit einsinkt, d. h. also, wieviel Chloroform der Luft beigemischt wird. Es ergab sich z. B., daß bei meinen Versuchen in der Minute 20,4 Liter Luft die Gasuhr paßierten und der Stab genau 0,05 cm einsank. Da der Stab einen Durchmesser von 9,1 mm hatte, so wurden auf diese 20,4 Liter Luft 0,429 ccm flüssiges Chloroform verdrängt. Da 1 ccm flüssiges Chloroform 300 ccm Chloroformdampf bei Zimmertemperatur und 76 cm Quecksilberdruck entspricht, so würde ein Gasgemisch von 0,62 % resultieren. Die Analyse wurde folgendermaßen ausgeführt: Eine besonders hierzu hergestellte Probeflasche, armiert wie eine Spritzflasche, statt

des Stopfen mit einem Schliffe versehen, von bekanntem Inhalt, wird an ihrem Ein- und Ausführungsrohr mit je einem Kautschukschlauch versehen. Alsdann saugt man die Chloroformluft durch die Flasche hindurch und klemmt beide Schläuche ab. Nun setzt man eine Flasche mit 20 ccm Alkohol Inhalt, deren Hals genau in einen der beiden Schläuche paßt, in diesen ein. Dann lüftet man die Klemme, schiebt die Flasche vor, bis Glas auf Glas reibt und gießt den Alkohol in die Probeflasche. Hierauf schüttelt man die Probeflasche gut durch, läßt den Alkohol nach 10 Minuten zurücklaufen und gießt ihn in einen Erlenmeierkolben. Hierauf wird mit 15 ccm Alkohol nachgespült und das Chlor, wie oben ausgeführt, bestimmt. Um ein Entweichen der in der Flasche eingeschlossenen Luft durch Lockern des Schliffes im Halse der Flasche zu vermeiden, wird der Schliff durch eine elastische Ligatur in den Hals der Flasche hineingedrückt.

Die Proben ergaben nun folgendes Resultat:

Probe Nr.	Gehalt der Flasche	ccm $\frac{1}{10}$ Normal- Silbernitrat- Lösung	Prozentfatz
I	610 ccm	4,55	0,60
II	630 "	4,25	0,60
III	610 "	4,6	0,60
IV	630 "	4,6	0,58
V	610 "	4,55	0,60
VI	630 "	4,6	0,58
VII	610 "	4,7	0,61
VIII	630 "	4,8	0,60
IX	610 "	4,2	0,61
X	630 "	4,8	0,60

Nach diesen Zahlen ergibt sich ein Gehalt von 0,58 bis 0,61 $\frac{0}{100}$, wohingegen der berechnete Wert 0,62 $\frac{0}{100}$ ist. Diese kleine Abweichung rührt von kleinen Ungenauigkeiten bei Bestimmung des Durchmessers des Rohres her,

die nicht zu vermeiden sind. Ferner ist die theoretische Berechnung etwas zu hoch, da das Chloroform 1⁰/₀ Alkohol enthält. Es ergibt sich demnach, daß die durch die Analyse gefundenen Werte mit den theoretischen übereinstimmen.

Bei den Tierversuchen wurde, wie oben angeführt, durch eine Trachealkanüle und Ventile geatmet. Die Ventile sind mit Quecksilber gefüllt und fein eingestellt. Das Inspirationsventil reicht bis tief in den Blechzylinder hinein. Um die Expirationsluft analysieren zu können, wird hinter das Expirationsventil eine der genannten Probeflaschen gelegt; und um die Atemgröße messen zu können, wird hinter die Probeflasche eine trockene Gasuhr eingeschaltet. Die Proben wurden in der beschriebenen Weise durch Abklemmen der Schläuche gewonnen und analysiert. Die Versuche wurden an Kaninchen und kleinen Hunden angestellt. Sie scheiden sich in drei Gruppen. Die erste wurde mit einem Gehalt der Inspirationsluft an Chloroformdampf von 0,60⁰/₀, die zweite von 0,93⁰/₀, die dritte von 1,40⁰/₀ angestellt. Innerhalb jeder Reihe wurden mehrfach Kontrollversuche vorgenommen, um zu prüfen, ob der Chloroformgehalt der Inspirationsluft stets derselbe geblieben sei. Es sei gleich im voraus bemerkt, daß Änderungen nicht vorkamen.

Versuchs-Protokoll.

Abkürzungen: Ag. L. = 1_{10} Normal-Sibernitrat-Lösung, E. Chl. D. = Gehalt der Expirationsluft an Chloroformdampf, I. Chl. D. = Gehalt der Inspirationsluft an Chloroformdampf.

Probeflasche I = 610 ccm Inhalt.

Probeflasche II = 630 ccm Inhalt.

Gruppe I.

Gehalt der Inspirationsluft: 0,58 0,61 % Chloroformdampf.

I. Versuch.

Weibliches Kaninchen, 1700 g schwer. Das Tier hat 79 Atemzüge und eine Maßdarmtemperatur von 38,6° C. Die Herzschläge sind kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird auf ein Warmwasserkissen gelegt, eine Trachealkanüle eingelegt und mit dem Apparat verbunden.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 ⁴⁶	0,43 l	92	38,6	Beginn d. Chloroformatmung am Apparat.
10		78	38,6	
10 ¹⁵		34	38,2	
10 ²²	0,45 l	41	38,2	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
10 ³⁰		41	38	
10 ³⁵		47	38,2	
10 ⁴⁵				
10 ⁴⁶	0,75 l	62	38,5	Probe I. 3,4 ccm Ag. L. = 0,45 % E. Chl. D. = 0,75 % I. Chl. D.
10 ⁵⁵		64	38,7	
11 ¹⁵		68	39,6	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
11 16				Probe II. 4,2 ccm Ag. L. = 0,53 % E. Chl. D. = 88 % I. Chl. D.
11 26	} 1,38 l	82	39,9	
11 29				
11 40		74	39,6	
11 55				Probe III. 4,6 ccm Ag. L. = 0,6 % E. Chl. D. = 100 % I. Chl. D.
11 57	} 0,85 l			
12		60	39,5	
12 15		58	39	Beginn einer leichten Narkose.
12 20				
12 25				Probe IV. 4,52 ccm Ag. L. = 0,57 % E. Chl. D. = 95 % I. Chl. D.
12 27	} 0,46 l			
12 30		56	39	Herzschlag etwas schwächer.
12 40				
12 45		67	38,9	
12 48	} 0,6 l			Probe V. 4,6 ccm Ag. L. = 0,60 % E. Chl. D. = 100 % I. Chl. D.

Es ist demnach das Verhältnis des Chloroformdampf-
gehaltes der Ausatemungsluft zur Einatemungsluft

nach 1 Stunde	= $\frac{4,5}{6,0}$ = 74 %
„ 1 1/2 Stunden	= $\frac{5,3}{6,0}$ = 88 %
„ 2 „	= $\frac{6,0}{6,0}$ = 100 %
„ 2 1/2 „	= $\frac{5,7}{6,0}$ = 95 %
„ 3 „	= $\frac{6,0}{6,0}$ = 100 %

Nach zwei Stunden ist also der Chloroformdampfgehalt
der Expirationsluft gleich dem der Inspirationsluft. Zu
beachten ist, daß die Atemgröße zwischen 0,43 und 1,38 Liter
pro Minute schwankt, und daß die Gleichheit des Chloro-

formdampfgehaltes der Expirationsluft und Inspirationsluft erst nach der Steigerung der Atemgröße eintritt.

II. Versuch.

Weibliches Kaninchen, 1600 g schwer. Das Tier zeigt 108 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von 38,7 ° C. Die Herzschläge sind kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird auf ein Warmwasserkissen gelegt und tracheotomiert.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 ⁴⁵	0,54 l	100	38,7	Beginn der Atmung am Apparat. Herzschlag kräftig. Vorübergehender Atemstillstand.
10 ⁷		51	38,8	
10 ¹⁷		44	38,7	
10 ²⁰				
10 ³⁵	0,52 l	62	38,7	Probe I. 4,4 ccm Ag. L. = 0,57% E. Chl. D. = 95% I. Chl. D.
10 ³⁵		60	38,7	
10 ⁴³		63	38,6	
10 ⁴⁵				
10 ⁴⁶	0,71 l	66	38,4	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen. Probe II. 4,6 Ag. L. = 0,58% E. Chl. D. = 97% I. Chl. D.
11 ²		68	38,3	
11 ¹³		66	38,5	
11 ¹⁵				
11 ¹⁶	0,65 l	81	38,5	Herzschlag kräftig. Probe III. 4,7 ccm Ag. L. = 0,61% E. Chl. D. = 100% I. Chl. D.
11 ³⁶		104	38,5	
11 ⁴⁶		72	38,7	
11 ⁵⁰				
11 ⁵¹	0,79 l	92	38,8	
11 ⁵⁴				
12 ²		102	38,6	
12 ¹⁴		102	38,6	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
12 ¹⁶				Probe IV. 4,8 ccm Ag. L. = 0,6% E. Chl. D. = 100% I. Chl. D.
12 ¹⁸	} 0,55 l	106	38,7	Abbrechen der Chloroform- atmung.
12 ²⁶		104	38,5	
12 ³⁰				
12 ³¹	} 0,8 l	100	38,3	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
12 ⁴¹		98	38,6	
12 ⁵¹	} 0,9 l	84	38,9	
12 ⁵⁹		90	38,9	
1				Probe VI. 0,75 ccm Ag. L. = 0,1% E. Chl. D.

Bei diesem Verluce ist das Chloroformdampfverhältnis der Einatmungsluft zur Ausatmungsluft

nach 1	Stunde	=	$\frac{57}{60}$	=	95 ⁰ / ₀
„	1 ¹ / ₂	Stunden	=	$\frac{58}{60}$	= 97 ⁰ / ₀
„	1 ³ / ₄	„	=	$\frac{61}{60}$	= 100 ⁰ / ₀
„	2 ¹ / ₄	„	=	$\frac{60}{60}$	= 100 ⁰ / ₀

Eine halbe Stunde nach Abstellen der Chloroformzufuhr beträgt der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft 0,1⁰/₀.

Es ist demnach nach 1³/₄ Stunden der Chloroformdampf der Ausatmungsluft gleich dem der Einatmungsluft. Ferner zeigt sich, daß nach einer halbstündigen Atmung von chloroformfreier Luft noch nicht alles Chloroform aus dem Körper ausgeschieden ist.

K o n t r o l l p r o b e n .

Die Probeflaschen wurden durch längeres Anfaugen mit der Chloroformluft aus dem Blechzylinder gefüllt.

10 ¹⁵	Beginn des Kontrollversuches			
11	Probe	I = 4,7 ccm	Ag. L. = 0,61%	
11 ³⁰	„	II = 4,8 „	Ag. L. = 0,60%	
12	„	III = 4,7 „	Ag. L. = 0,61%	
12 ³⁰	„	IV = 4,7 „	Ag. L. = 0,59%	
1	„	V = 4,75 „	Ag. L. = 0,62%	

III. Versuch.

Männliches Kaninchen 1500 g schwer, kräftige Konstitution. Das Tier zeigt 120 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von 39,1° C. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 ⁵⁴	0,79 l	66	39,3	Beginn der Atmung am Apparat.
10				Beginn d. Chloroformatmung.
10 ⁶		104	39,2	Herzschlag kräftig.
10 ¹⁰	0,69 l	69	39,2	
10 ²⁰		60	39,2	
10 ³⁰		60	39,0	
10 ⁴⁰	0,55 l	66	39,1	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
10 ⁴⁸				
10 ⁴⁵		68	39,2	
				Probe I. 4,1 ccm Ag. L. = 0,54% E. Chl. D. = 90% I. Chl. D.
10 ⁴⁹	0,7 l	70	39,2	
10 ⁵⁹		72	39,2	
11 ⁹		74	39,4	
11 ¹⁴	0,65 l	83	39,5	
11 ¹⁵				Probe II. 4,2 ccm Ag. L. = 0,53% E. Chl. D. = 88% I. Chl. D.
	0,67 l			
11 ¹⁶		74	39,6	
11 ²⁶		90	39,6	Herzschlag kräftig.
11 ³⁶	0,6 l	80	39,5	
11 ⁴⁴	0,6 l	92	39,6	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
11 ⁴⁵				Probe III. 3,7 ccm Ag. L. = 0,49% E. Chl. D. = 82% I. Chl. D.
11 ⁵⁰	} 0,8 l	84	39,6	
12		90	39,6	
12 ¹⁹		108	39,5	
12 ¹⁴		102	39,4	
12 ¹⁵				Probe IV. 4,3 ccm Ag. L. = 0,55% E. Chl. D. = 92% I. Chl. D.
12 ¹⁸	} 0,58 l	73	39,4	Eintreten nur leicht, Narkose.
12 ²⁶		75	39,4	
12 ³⁸		72	39,35	
12 ⁴⁵				
				Probe V. 4,4 ccm Ag. L. = 0,58% E. Chl. D. = 97% I. Chl. D.
12 ⁴⁶				Abbrechen der Chloroform- atmung.
1	} 0,8 l	72	39,2	
1 ¹⁰		78	38,8	
1 ¹⁵				
1 ¹⁶	} 0,7 l	75	38,7	Probe VI. 0,7 ccm Ag. L. = 0,09% E. Chl. D.
1 ²⁸		84	39,1	
1 ³⁸		78	39,2	
1 ⁴⁵				
				Probe VII. 0,5 ccm Ag. L. = 0,06% E. Chl. D.

Das Chloroformverhältnis der Ausatemungsluft zur Ein-
atemungsluft beträgt also hiernach

nach	$\frac{3}{4}$ Stunden	=	$\frac{54}{60}$	=	90%
"	$1\frac{1}{4}$ "	=	$\frac{53}{60}$	=	88%
"	$1\frac{3}{4}$ "	=	$\frac{49}{60}$	=	82%
"	$2\frac{1}{4}$ "	=	$\frac{55}{60}$	=	92%
"	$2\frac{3}{4}$ "	=	$\frac{58}{60}$	=	97%

Nach Abstellen der Chloroformzufuhr beträgt der Chloroformdampf der Expirationsluft

nach $\frac{1}{2}$ Stunde = 0,09%

„ 1 „ = 0,06%

Es tritt bei diesem Versuche erst nach einer Dauer von $2\frac{3}{4}$ Stunden eine fast vollständige Gleichheit der Expirationsluft und Inspirationsluft an Chloroformdampf, nämlich 97% ein, nachdem das Verhältnis über 2 Stunden lang 90% betragen hatte. Die Atemgröße betrug während des Versuches durchschnittlich 0,7 Liter pro Minute, so schwankt im ganzen zwischen 0,5 und 0,9 Liter pro Minute.

IV. Versuch.

Teckelhündin, 2000 g schwer, $2\frac{1}{2}$ Monate alt. Das Tier zeigt 40 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von 39,0° C. Das Herz schlägt kräftig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 ⁴⁵		70	38,8	Beginn der Atmung am Apparat.
10 ³		72	38,9	Beginn d. Chloroformatmung.
10 ⁵	} 2,8 l	74	39,1	
10 ¹⁰		120	39,3	Mangelhafte Chloroformzufuhr am Apparat.
10 ¹⁵	} 2 l	112	39,2	Schaden reguliert.
10 ²⁰		90	39	
10 ²⁵	} 1,3 l	84	39,1	
10 ³⁵		90	39	
10 ⁴³	} 1,2 l	102	38,9	Leichte Narkose. Die Vorderbeine werden entfeilt.
10 ⁴⁵				Probe I. 4,3 ccm Ag. L. = 0,56% E. Chl. D. = 93% I. Chl. D.
10 ⁴⁶	} 1,4 l	96	38,8	
10 ⁵⁶		85	38,8	
11 ⁶	} 1,8 l	120	38,9	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
11 ¹²		112	38,9	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
11 ¹⁵				Probe II. 4,4 Ag. L. = 0,56% E. Chl. D. = 93% I. Chl. D.
11 ¹⁶	} 1,7 l 1,95 l 1,5 l	108	39,0	
11 ²⁶		108	39,0	
11 ³⁶		112	39,1	
11 ⁴³		102	38,9	
11 ⁴⁴				Probe III. 4,2 Ag. L. = 0,53% E. Chl. D. = 92% I. Chl. D.
11 ⁴⁵	} 2,2 l 2,0 l 2,1 l	120	38,9	
11 ⁵⁵		102	38,9	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kiffen.
12 ⁵		126	39,1	
12 ¹²		126	39,1	
12 ¹⁴				Probe IV. 4,5 Ag. L. = 0,57% E. Chl. D. = 95% I. Chl. D.
12 ¹⁵	} 2,5 l 1,6 l	120	39,2	
12 ²⁵		132	39,1	
12 ³⁵		134	39,2	
12 ³⁸				Probe V. 4,1 ccm Ag. L. = 0,53% E. Chl. D. = 89% I. Chl. D.
12 ⁴⁰	} 2,3 l	120	39,0	
12 ⁴⁸		132	38,9	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kiffen.
12 ⁵⁰				Probe VI. 4,7 ccm Ag. L. = 0,60% E. Chl. D. = 100% I. Chl. D.
12 ⁵⁴				Die Chloroformatung wird abgebrochen.
1 ⁰	} 1,8 l 2 l 2,5 l 2,1 l	150	39,1	
1 ³		140	39,1	
1 ⁸		96	39,2	
1 ¹³		140	39,3	
1 ²⁰		103	39	
1 ²²				Probe VII. 0,4 ccm Ag. L. 0,05% E. Chl. D.
1 ²⁴	} 2 l 2,5 l	98	39	
1 ³⁴		108	39,0	
1 ³⁷		72	38,9	
1 ⁴⁵				Probe VIII. 0,25 ccm Ag. L. 0,03% E. Chl. D.

Es ist also das Chloroformdampfverhältnis der Ausatmungsluft zur Einatmungsluft

nach	$\frac{1}{2}$ Stunde	$= \frac{56}{60} = 93\%$
"	1 "	$= \frac{56}{60} = 93\%$
"	$1\frac{1}{2}$ Stunden	$= \frac{53}{60} = 92\%$
"	2 "	$= \frac{57}{60} = 95\%$
"	$2\frac{1}{4}$ "	$= \frac{53}{60} = 89\%$
"	$2\frac{3}{4}$ "	$= \frac{60}{60} = 100\%$

Nach Abstellen der Chloroformzufuhr beträgt der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft

nach	$\frac{1}{2}$ Stunde	0,05%
"	$\frac{3}{4}$ Stunden	0,03%

Nach $2\frac{3}{4}$ Stunden ist demnach der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft gleich dem der Inspirationsluft, nachdem derselbe sich über 2 Stunden auf durchschnittlich 93% gehalten hatte. $\frac{3}{4}$ Stunden nach Abstellen der Chloroformzufuhr waren und noch geringe Mengen Chloroformdampf in der Expirationsluft nachweisbar.

Kontrollproben.

Die Flaschen werden durch längeres Anfaugen mit der Chloroformluft aus dem Blechzylinder gefüllt und dann analysiert

Probe	I	= 4,5 ccm Ag. L. = 0,59%
Probe	II	= 4,75 " Ag. L. = 0,60%
Probe	III	= 4,6 " Ag. L. = 0,60%

V. Versuch.

Spitz, Hund, $4\frac{1}{2}$ Monate alt, 4900 g schwer. Das Tier zeigt 49 Atemzüge pr. Min. und eine Mastdarmtemperatur von $39,3^{\circ}$ C. Die Herzschläge sind kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
10 ⁷				Chloroformatmung am Ap- parat.
10 ⁸	} 2,4 l	120	39,3	
10 ¹⁶		102	39,3	
10 ²⁶		92	39,3	
10 ³⁶		76	39,3	
10 ³⁷				Probe I. 3,7 ccm Ag. L. = 0,49% E. Chl. D. = 81% I. Chl. D.
10 ⁴²	} 2,5 l	108	39,3	
10 ⁵²		72	39,3	Herzschlag kräftig, leichte Narkose.
11 ²		90	39,3	
11 ⁵	} 4 l	92	39,3	
11 ⁷				Probe II. 4,2 ccm Ag. L. = 0,53% E. Chl. D. = 89% I. Chl. D.
11 ¹³	} 5 l	72	39,3	
11 ²³		82	39,0	
11 ²³		95	38,8°	
11 ³⁷		85	38,5	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
11 ⁴⁰				Probe III. 4,0 ccm Ag. L. = 0,52% E. Chl. D. = 87% I. Chl. D.
11 ⁴³	} 3 l	96	38,7	
11 ⁵³		90	39,0	
12 ³		90	39,2	
12 ⁷		94	39,3	
12 ¹⁰				Probe IV. 4,2 ccm Ag. L. = 0,53% E. Chl. D. = 89% I. Chl. D.
12 ¹³	} 4,5 l	68	39,3	
12 ²³		108	39,2	
12 ³³		84	39,2	
12 ³⁴				Probe V. 4,4 ccm Ag. L. = 0,58% E. Chl. D. = 96% I. Chl. D.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
12 ³⁶	2,5 l	104	39,2	Probe VI. 4,6 ccm Ag. L. = 0,58% E. Chl. D. = 97,3% I. Chl. D.
12 ⁴⁶		96	39,3	
12 ⁴⁸		102	39,2	
12 ⁵¹				
12 ⁵⁵	5,7 l	103	39,2	Chloroformzufuhr abgestellt.
1 ⁵		115	39,2	
1 ¹⁰		108	39,2	
1 ²⁰		120	39,2	
1 ³⁰				Probe VII. 0,3 ccm Ag. L. = 0,04 % E. Chl. D.

Das Chloroformdampfverhältnis der Expirationsluft zur Inspirationsluft ist demnach

nach	1/2 Stunde	=	$\frac{49}{60}$	=	81 ⁰ / ₀
"	1 "	=	$\frac{53}{60}$	=	89 ⁰ / ₀
"	1 1/2 Stunden	=	$\frac{25}{60}$	=	87 ⁰ / ₀
"	2 "	=	$\frac{53}{60}$	=	89 ⁰ / ₀
"	2 1/2 "	=	$\frac{58}{60}$	=	96 ⁰ / ₀
"	2 3/4 "	=	$\frac{58}{60}$	=	97,3 ⁰ / ₀

Eine halbe Stunde nach Abstellen der Chloroformzufuhr beträgt der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft 0,04⁰/₀.

Nach 2¹/₂ Stunden ist also der Chloroformdampf der Expirationsluft beinahe gleich dem der Inspirationsluft. Nach einer Stunde beträgt der Chloroformdampf der Expirationsluft 89⁰/₀ der Inspirationsluft und hält sich eine ganze Stunde auf dieser Höhe. Dann erst steigt er weiter an, um nach 2¹/₂ Stunden 96 bez. 97,3⁰/₀ zu erreichen. Die Atemgröße steht in der ersten Stunde relativ niedrig, 2,5—3,0 l pro Min. Dann hebt sie sich auf 3,5 bis 5,5 l

pro Min. Auch während der Zeit des höchsten Gehaltes der Expirationsluft an Chloroform schwebt sie zwischen diesen Ziffern. $\frac{1}{2}$ Stunde nach Abstellen der Chloroformzufuhr werden noch geringe Mengen Chloroform mit der Expirationsluft ausgeschieden.

VI. Versuch.

Männliches Kaninchen, 1700 g schwer. Das Tier zeigt 110 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von $38,8^{\circ}$ C. Der Herzschlag ist kräftig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 30		124	39,2	Beginn der Atmung am Ap- rat
9 35	} 1,0 l 0,5 l 0,45 l 0,5 l	129	39,2	Beginn d. Chloroformatmung
9 45		47	39,2	
9 55		56	39,2	
10 5		36	39,3	
10 15		38	39,4	
10 20				Probe I. 3,7 ccm Ag. L. = 0,49% E. Chl. D. = 81% I. Chl. D.
10 21	} 0,55 l 0,5 l 1,0 l	48	39,5	
10 31		50	39,5	
10 41		50	39,5	
10 46		56	39,5	
10 50				
				Probe II. 4,2 ccm Ag. L. = 0,53% E. Chl. D. = 89% I. Chl. D.
10 52	} 0,6 l 0,8 l 1,0 l 1,2 l 0,9 l	67	39,5	
11 2		52	39,5	
11 12		60	39,5	
11 18		62	39,5	
11 23		92	39,4	
11 30		93	39,3	
				Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
11 31				Probe III. 4,4 ccm Ag. L. = 0,58% E. Chl. D. = 96% I. Chl. D.
11 33	} 1,2 l	95	39,4	
11 43		91	39,5	
11 53		97	39,5	
12		99	39,6	
12 1				
				Probe IV. 4,6 ccm Ag. L. = 0,584% E. Chl. D. = 97,3% I Chl. D.
12 4	} 1,1 l	96	39,5	
12 14		102	39,5	
12 24		97	39,5	
12 25				
12 30	} 1,35 l	89	39,5	Probe V. 4,5 ccm Ag. L. = 0,59% E. Chl. D. = 98,3% I. Chl. D
12 40		108	39,5	Chloroformzufuhr abgestellt.
12 50		112	39,5	
12 59		116	39,5	
1				
				Probe VI 0,5 ccm Ag. L. = 0,06% E. Chl. D.
1	} 1,1 l	94	39,5	
1 21		102	39,5	
1 31		91	39,5	
1 45		87	39,4	
				Probe VII. 0,3 ccm Ag. L. = 0,04% E. Chl. D.

Das Chloroformdampfverhältnis der Expirationsluft zur Inspirationsluft ist also

$$\begin{array}{rclcl}
 \text{nach } \frac{3}{4} \text{ Stunden} & = & \frac{4,9}{6,0} & = & 81\% \\
 \text{„ } 1\frac{1}{4} \text{ „} & = & \frac{5,3}{6,0} & = & 89\% \\
 \text{„ } 2 \text{ „} & = & \frac{5,8}{6,0} & = & 96\% \\
 \text{„ } 2\frac{1}{2} \text{ „} & = & \frac{5,8,4}{6,0} & = & 97,3\% \\
 \text{„ } 2\frac{3}{4} \text{ „} & = & \frac{5,9}{6,0} & = & 98,3\%
 \end{array}$$

Nach Abstellen der Chloroformzufuhr beträgt der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft

nach $1\frac{1}{2}$ Stunde 0,06 ‰

„ $5\frac{1}{4}$ Stunden 0,04 ‰

Nach $2\frac{1}{2}$ Stunden ist der Chloroformgehalt der Expirationsluft gleich dem der Inspirationsluft. Bemerkenswert ist das stete Ansteigen des Prozentgehaltes von 81 ‰ auf 98,3 ‰. Die Atemgröße beträgt in der ersten Stunde durchschnittlich 0,6 l pro Minute, steigt dann auf 1 l pro Minute und erreicht gegen Ende des Versuches den Höhepunkt von 1,35.

$1\frac{1}{4}$ Stunden nach Abstellen der Chloroformzufuhr werden noch geringe Mengen Chloroformdampf mit der Expirationsluft ausgeschieden.

Gruppe II.

Gehalt der Inspirationsluft: 0,91—0,93 ‰ Chloroformdampf.

Kontroll-Versuch.

Die Probefläschen werden durch längeres Anfaugen mit der Chloroformluft aus dem Blechzylinder gefüllt.

10	Beginn des Kontrollversuches
10 ³⁰	Probe I = 7,1 ccm Ag. L. = 0,931 ‰
11	Probe II = 7,2 „ Ag. L. = 0,914 ‰
11 ³⁰	Probe III = 7,1 „ Ag. L. = 0,931 ‰
12	Probe IV = 7,2 „ Ag. L. = 0,914 ‰
12 ³⁰	Probe V = 7,05 „ Ag. L. = 0,924 ‰

I. Versuch.

Männliches Kaninchen, 1500 g schwer. Das Tier zeigt 96 Atemzüge pro Min. und eine Mastdarmtemperatur von 39,0° C. Der Herzschlag ist kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 3 5				Beginn der Atmung am Apparat.
9 3 7,5	0,72 l 0,7 l 0,65 l 0,65 l	96	39,2	Beginn d. Chloroformatmung.
9 4 5		95	39,3	
10		104	39,7	
10 1 0		82	39,9	
10 2 0		92	40,2	
10 2 2	0,85 l 0,9 l 0,85 l 0,83 l			Beginnende Narkose.
				Probe I. 6,2 ccm Ag. L. = 0,81% E. Chl. D. = 88% I. Chl. D.
10 2 3		89	40,2	
10 3 3		96	40,0	
10 4 3		120	39,6	
10 5 0		114	39,4	
10 5 2				Probe II. 6,7 ccm Ag. L. = 0,85% E. Chl. D. = 92% I. Chl. D.
10 5 4	0,95 l 0,85 l 0,83	104	39,2	Tiefe Narkose. Alle 4 Beine werden entfeffelt, vollständig schlaff; keine Reaktion auf Kneifen. Cornea-reflex vorhanden.
11 4		112	39,2	
11 1 4	0,83	120	39,3	Herzschlag kräftig.
11 2 0		120	39,3	
11 2 1				
				Probe III. 6,4 ccm Ag. L. = 0,84% E. Chl. D. = 91% I. Chl. D.
11 2 2	0,85 l 0,8 l 0,74 l	120	39,3	Herzschlag schwächer.
11 3 2		120	39,3	
11 4 2		120	39,3	
11 5 0		120	39,3	
11 5 1				
				Herzschlag klein.
				Probe IV. 7,0 ccm Ag. L. = 0,89% E. Chl. D. = 97% I. Chl. D.
11 5 2				Tod des Kaninchens.

Das Chloroformdampfverhältnis der Expirationsluft zur Inspirationsluft ist demnach:

$$\begin{aligned} \text{nach } \frac{3}{4} \text{ Stunden} &= \frac{81}{92} = 88\% \\ \text{" } \frac{5}{4} \text{ " } &= \frac{7}{12} = 92\% \\ \text{" } 1\frac{3}{4} \text{ " } &= \frac{84}{92} = 91\% \\ \text{" } 2\frac{1}{4} \text{ " } &= \frac{89}{92} = 97\% \end{aligned}$$

Nach $2\frac{1}{4}$ Stunden ist der Chloroformgehalt der Expirationsluft beinahe gleich dem der Inspirationsluft. Die Atemgröße beträgt in den ersten 45 Minuten 0,65–0,72 Liter pro Minute, während der übrigen Zeit schwankt sie zwischen 0,72 und 0,85 Liter pro Minute.

II. Versuch.

Männliches Kaninchen, 1500 g schwer. Das Tier zeigt 72 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von $38,7^{\circ}\text{C}$. Der Herzschlag ist kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atemgröße pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 ⁵⁰		90	38,7	Beginn der Atmung am Apparat.
9 ⁵⁷	} 0,75 l 0,6 l 0,6 l 0,7 l 0,9 l	78	38,7	Beginn d. Chloroformatmung.
10 ⁷		49	38,6	
10 ¹⁷		68	38,6	
10 ²⁷		60	38,7	
10 ³⁷		84	38,7	
10 ⁴⁴		87	38,7	
10 ⁴⁵				Probe I. 6,0 ccm Ag. L. = 0,79% E. Chl. D. = 85% I. Chl. D.
10 ⁴⁷	} 0,75 l 0,7 l	68	38,7	Leichte Narkose. Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
10 ⁵⁷		66	38,6	
11 ⁷		96	38,8	
11 ¹⁴		92	38,8	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
11 ¹⁵				Probe II. 6,3 ccm Ag. L. = 0,80% E. Chl. D. = 87% I. Chl. D.
11 ¹⁷	} 0,9 l 1,1 l 1,2 l	98	38,9	
11 ²⁷		102	38,9	
11 ³⁷		120	39,0	
11 ⁴⁴		120	39,0	
11 ⁴⁵				Probe III. 6,45 ccm Ag. L. = 0,85% E. Chl. D. = 92% I. Chl. D.
11 ⁴⁷	} 1,1 l	114	39,0	
11 ⁵⁷		114	39,0	Tiefe Narkose. Sämtliche Beine entfesselt. Vollständig schlaff. Keine Reaktion auf Kneifen. Corneareflex vor- handen.
	} 1,0 l			
12 ⁷		114	39,0	Eintreten starker Speichel- sekretion.
12 ¹⁴	} 1,1 l	114	39,0	Herzschlag schwächer.
12 ¹⁵				Probe IV. 6,8 ccm Ag. L. = 0,86% E. Chl. D. = 94% I. Chl. D.
12 ¹⁸	} 1,05 l 1,1 l	122	39,0	
12 ²⁵		120	39,0	Herzschlag klein.
12 ³²		33	39,0	Probe V. 7,0 ccm Ag. L. = 0,92% E. Chl. D. = 100% I. Chl. D.
22 ³³				Eintreten des Todes.

Das Chloroformdampfverhältnis der Expirationsluft zur Inspirationsluft ist also

$$\begin{aligned}
 \text{nach } \frac{3}{4} \text{ Stunden} &= \frac{7,8,6}{9,2} = 85\% \\
 \text{„ } \frac{5}{4} \text{ „} &= \frac{8,0}{9,2} = 87\% \\
 \text{„ } 1\frac{3}{4} \text{ „} &= \frac{8,5}{9,2} = 92\% \\
 \text{„ } 2\frac{1}{4} \text{ „} &= \frac{8,6,5}{9,2} = 94\% \\
 \text{„ } 2\frac{1}{2} \text{ „} &= \frac{9,2}{9,2} = 100\%
 \end{aligned}$$

Nach 2¹/₄ Stunden ist der Chloroformgehalt der Expirationsluft gleich dem der Inspirationsluft. Die Atemgröße beträgt in der ersten Stunde durchschnittlich 0,7 Liter pro Minute, während der übrigen Zeit des Versuches durchschnittlich 1 Liter pro Minute.

III. Versuch.

Teckelhündin, 2000 g schwer, 2¹/₂ Monate alt (dieselbe von Versuch IV, Gruppe I). Das Tier zeigt 42 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von 38,9° C. Daselbe wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
10 ²⁴				Beginn der Atmung am Apparat.
10 ³¹	1,9 l 2,3 l 2,6 l	120	39,8	Beginn d. Chloroformatmung.
10 ⁴¹		128	39,8	
10 ⁵¹		126	39,8	Beginnende Narkose.
10 ⁵⁸		128	39,7	
11				Probe I. 5,8 ccm Ag. L. = 0,76% E. Chl. D. = 83% I. Chl. D.
11 ²	1,8 l 2,0 l 2,5 l	120	39,5	
11 ¹²		118	39,4	Tiefe Narkose. Entfesseln sämtlicher Beine.
11 ²²		120	39,4	
11 ²⁸		132	39,4	
11 ³⁰				Probe II. 6,2 ccm Ag. L. = 0,787% E. Chl. D. = 86% I. Chl. D.
11 ³¹	2,15 l 2,2 l 1,95 l	130	39,4	Nachfüllen von warmem Wasser ins Kissen.
11 ⁴¹		120	39,3	
11 ⁵¹		120	39,5	Herzschlag kräftig.
11 ⁵⁸		120	39,6	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
12				Probe III. 6,2 ccm Ag. L. = 0,81% E. Chl. D. = 88% I. Chl. D.
12 ¹	} 2,1 l	120	39,6	
12 ^{1 1}		118	39,5	
12 ^{2 1}		120	39,5	
12 ^{2 8}		123	39,5	
12 ^{2 9}				Probe IV. 6,3 ccm Ag. L. = 0,8% E. Chl. D. = 87% I. Chl. D.
12 ^{3 0}	} 1,7 l	114	39,5	
12 ^{4 0}		96	39,5	Herzschlag schwächer.
12 ^{5 0}		112	39,4	
12 ^{5 9}		118	39,4	
1				Probe V. 6,55 ccm Ag. L. = 0,86% E. Chl. D. = 93% I. Chl. D.
1 ²	} 1,9 l	106	39,4	Herzschlag klein.
1 ⁷		104	39,4	
1 ^{1 2}		96	39,3	
1 ^{1 6}		53	39,3	Probe VI. 6,9 ccm Ag. L. = 0,88% E. Chl. D. = 95% I. Chl. D.
1 ^{1 7}				Eintreten des Todes.

Das Chloroformdampfverhältnis der Ausatemungsluft zur Einatemungsluft ist demnach

nach	$1\frac{1}{2}$ Stunde	=	$\frac{76}{92}$	=	83%
"	1 "	=	$\frac{79}{92}$	=	86%
"	$1\frac{1}{2}$ Stunden	=	$\frac{81}{92}$	=	88%
"	2 "	=	$\frac{80}{92}$	=	87%
"	$2\frac{1}{2}$ "	=	$\frac{85}{92}$	=	93%
"	$2\frac{3}{4}$ "	=	$\frac{88}{92}$	=	95%

Nach $2\frac{3}{4}$ Stunden ist also der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft beinahe gleich dem der Inspirationsluft,

nachdem derselbe sich während $1\frac{1}{2}$ Stunden auf durchschnittlich 87° gehalten hatte. Die Atmungsgröße schwankt während des ganzen Versuches zwischen 2,1 Liter und 1,7 Liter pro Minute. Nach $2\frac{3}{4}$ Stunden tritt der Tod ein.

IV. Versuch.

Spitz, Hund, 5 Monate alt, 4900 g schwer. Derselbe wie Versuch IV, Gruppe I. Das Tier zeigt 34 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von $39,0^{\circ}$ C. Die Herzschläge sind kräftig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atemgröße pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
10	2,3 l	104	39,0	Beginn der Atmung am Apparat.
10 4		114	39,0	Beginn d. Chloroformatmung.
10 10		122	39,2	
10 15	5 l	74	39,3	Leichte Narkose.
10 20		72	39,3	
10 30	2,9 l	60	39,3	
10 34				
				Probe I. 5,65 ccm Ag. L. = 0,74 % E. Chl. D. = 80 % I. Chl. D.
10 38	2,8 l	42	39,2	Tiefe Narkose. Entfesseln der Beine.
10 48		42	39,0	
	2,1 l			
10 58	2,15 l	42	39,0	Probe II. 6,0 ccm Ag. L. = 0,76 % E. Chl. D. = 83 % I. Chl. D.
11 3		40	39,0	
11 5				
11 6	1,8 l	44	39,0	Herz kräftig.
11 16		38	39,0	
11 26		43	39,0	
11 33	2,0 l	38	39,0	
11 35				Probe III. 5,9 ccm Ag. L. = 0,77 % E. Chl. D. = 84 % I. Chl. D.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
11 38	2,5 l	38	38,9	Vorübergehende starke Er- regung.
11 48		90	38,8	
	3,4 l			
11 58	2,4 l	75	38,9	
12 3		60	39,0	
12 5				Probe IV. 6,1 ccm Ag. L. = 0,77 % E. Chl. D. 84 % I Chl. D.
12 8	1,9 l	42	39,0	Vorübergehende Erregung.
12 18		48	39,1	
12 28	3,8 l	72	39,2	
12 33		84	39,1	
12 35				Probe V. 6,5 ccm Ag. L. = 0,85 % E. Chl. D. = 93 % I Chl. D.
12 38	1,5 l	54	39,0	Herzschlag klein.
12 45		36	39,0	
12 54		21	38,9	
				Probe VI. 6,85 ccm Ag. L. = 0,87 % E. Chl. D. = 95 % I Chl. D.
12 55				Tod.

Das Chloroformdampfverhältnis der Ausatemungsluft zur Einatemungsluft ist also:

nach $1\frac{1}{2}$ Stunde	=	$\frac{7}{9}\frac{4}{2}$	=	80%
" 1 "	=	$\frac{7}{9}\frac{6}{2}$	=	83%
" $1\frac{1}{2}$ Stunden	=	$\frac{7}{9}\frac{7}{2}$	=	84%
" 2 "	=	$\frac{7}{9}\frac{7}{2}$	=	84%
" $2\frac{1}{2}$ "	=	$\frac{8}{9}\frac{5}{2}$	=	93%
" $2\frac{3}{4}$ "	=	$\frac{8}{9}\frac{7}{2}$	=	95%

Nach $2\frac{3}{4}$ Stunden ist also der Chloroformdampfgehalt der Expirationsluft beinahe gleich dem der Inspirationsluft, nachdem derselbe sich während $1\frac{1}{2}$ Stunden durchschnittlich auf 84% gehalten hatte. Die Atemgröße steht in der ersten $\frac{3}{4}$ Stunde relativ hoch, 2,3 bis 5 Liter pro

Minute, sodann fällt sie bis auf 1,8 Liter und schwankt während der übrigen Zeit zwischen 1,8 Liter und 3,8 Liter pro Minute. Nach $2\frac{3}{4}$ Stunden tritt der Tod ein.

Gruppe III.

Gehalt der Inspirationsluft: 1,40 -- 1,42 % Chloroformdampf.

Kontrollversuch.

Die Probeflächen werden durch Anfaugen mit der Chloroformluft aus dem Blechzylinder gefüllt.

Probe	I	=	10,7 ccm	Ag. L.	=	1,40 %
"	II	=	11,0 "	Ag. L.	=	1,40 %
"	III	=	10,85 "	Ag. L.	=	1,42 %
"	IV	=	11,1 "	Ag. L.	=	1,41 %

I. Versuch.

Weibliches Kaninchen, 1750 g schwer. Das Tier hat 74 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von 39,1° C. Die Herzschläge sind kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atemgröße pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 50		60	39,1	Beginn der Atmung am Apparat.
9 52	} 1,0 l 0,7 l 0,75 l	62	39,1	Beginn d. Chloroformatmung.
9 56		66	39,1	
10 1		63	39,1	
10 5		66	38,9	Nachfüllen von heißem Wasser ins Kissen.
10 8	} 0,9 l			Beginnende Narkose. Keine Reaktion auf Kneifen.
				Corneareflex vorhanden. Starke Speichelsekretion.
10 15	} 0,95 l	108	38,9	
10 20		118	38,9	

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
10 2 1				Probe I. 9,4 ccm Ag. L. = 1,23 % E. Chl. D. = 87 % I. Chl. D.
10 2 2	} 0,9 l	118	38,9	Tiefe Narkose. Kein Cornea- reflex.
10 3 2		112	39,0	
10 4 0		117	39,0	
10 4 1				Probe II. 9,5 ccm Ag. L. = 1,21 % E. Chl. D. = 86 % I. Chl. D.
10 4 3	} 0,7 l	114	39,1	
10 5 0		101	39,1	
10 5 2		56	39,1	
10 5 3				Probe III. 10,1 ccm Ag. L. = 1,32 % E. Chl. D. = 94 % I. Chl. D.
10 5 4				Eintreten des Todes.

Das Chloformdampfverhältnis der Ausatemungsluft zur Einatemungsluft ist also

$$\begin{aligned}
 \text{nach 30 Minuten} &= \frac{1,23}{1,41} = 87 \% \\
 \text{„ 50 „} &= \frac{1,21}{1,41} = 86 \% \\
 \text{„ 60 „} &= \frac{1,32}{1,41} = 94 \%
 \end{aligned}$$

Die Atemgröße beträgt während der ersten 45 Minuten durchschnittlich 0,9 Liter pro Minute, um gegen Ende des Versuches auf 0,4 Liter pro Minute zu sinken. Der Tod tritt nach einer Versuchsdauer von 60 Minuten ein.

II. Versuch.

Weibliches Kaninchen, 1510 g schwer. Das Tier hat 82 Atemzüge und eine Mastdarmtemperatur von 39,2° C. Die Herzschläge sind kräftig, gleichmäßig und regelmäßig. Das Tier wird tracheotomiert etc.

Zeit	Atem- größe pro Min.	Anzahl der Atem- züge	Tempe- ratur	Bemerkungen
9 30	} 1,0 l 0,7 l	85	39,0	Beginn d. Chloroformatmung.
9 35		90	39,2	
9 39		76	39,1	Beginnende Narkose.
9 40				Probe I. 8,70 ccm Ag. L. = 1,14 % E. Chl. D. — 81 % I. Chl. D.
9 42	} 1,1 l 1,0 l	60	39,1	
9 52		66	39,0	Tiefe Narkose. Herzschlag kräftig.
10		108	39,0	Nachschütten von warmem Wasser ins Kissen.
10 2				Probe II. 9,5 ccm Ag. L. = 1,71 % E. Chl. D. — 86 % I. Chl. D.
10 3	} 0,9 l 0,65 l	94	38,9	
10 10		92	39,0	Herzschlag klein.
10 18		36	39,1	
10 19				Probe III. 9,8 ccm Ag. L. = 1,28 % E. Chl. D. — 91 % I. Chl. D.
10 20				Eintreten des Todes.

Das Chloroformdampfverhältnis der Ausatemungsluft zur Einatemungsluft beträgt also

$$\text{nach 10 Minuten} = \frac{1,14}{1,41} = 81 \%_0$$

$$\text{„ 30 „} = \frac{1,21}{1,41} = 86 \%_0$$

$$\text{„ 50 „} = \frac{1,28}{1,41} = 91 \%_0$$

Die Atmungsgröße beträgt während der ersten 30 Minuten durchschnittlich 0,9 Liter pro Minute, gegen Ende des Versuches sinkt sie auf 0,65 Liter pro Minute. Der Tod tritt nach einer Versuchsdauer von 50 Minuten ein.

Kontrollversuch.

Die Probeflaschen werden durch Anfaugen mit der Chloroformluft aus dem Blechzylinder gefüllt.

Probe	I	=	10,7 ccm	Ag. L.	=	1,40 ‰
„	II	=	11,0 „	Ag. L.	=	1,40 ‰
„	III	=	10,75 „	Ag. L.	=	1,41 ‰
„	IV	=	11,1 „	Ag. L.	=	1,41 ‰

Überblickt man nun die mitgeteilten Versuche, so ergibt sich, daß in der Tat bei langer Dauer des Versuches der Gehalt der Expirationsluft an Chloroformdampf dem der Inspirationsluft gleichkommt. Es betrug in Gruppe I der Gehalt der Inspirationsluft an Chloroformdampf 0,60 ‰, im Mittel, der Gehalt der Expirationsluft an Chloroformdampf

in Versuch I nach	2 ³ / ₄ Stunden	0,59 ‰
„ „ II „	2 ¹ / ₄ „	0,60 ‰
„ „ III „	2 ³ / ₄ „	0,57 ‰
„ „ IV „	2 ³ / ₄ „	0,60 ‰
„ „ V „	2 ³ / ₄ „	0,584 ‰
„ „ VI „	2 ³ / ₄ „	0,59 ‰

Demnach war hier in der Tat die Zusammenfügung der Expirationsluft die gleiche, wie die der Inspirationsluft.

Bei den beiden andern Gruppen mit höherem Chloroformgehalt der Inspirationsluft trat zum Schluß der Tod des Tieres ein. Doch konnte die erste hier in Betracht kommende Reihe soweit durchgeführt werden, daß sie im wesentlichen das gleiche Resultat ergab.

In Gruppe II betrug der Gehalt der Inspirationsluft an Chloroformdampf 0,92 ‰, der der Expirationsluft

in Versuch I nach	2 ¹ / ₄ Stunden	0,89 ‰
„ „ II „	2 ¹ / ₂ „	0,92 ‰
„ „ III „	2 ³ / ₄ „	0,88 ‰
„ „ IV „	2 ³ / ₄ „	0,87 ‰

In Gruppe III betrug der Gehalt der Inspirationsluft an Chloroformdampf 1,41 ‰, der der Expirationsluft

in Versuch I nach	60 Minuten	1,32 ‰
„ „ II „	49 „	1,28 ‰

Die letzten Versuche konnten nicht weiter geführt werden, da der Tod des Tieres eintrat. Immerhin zeigen auch sie, daß nahezu Gleichheit auch bei diesem Prozentgehalt eintritt.

Es ergibt sich demnach, daß, falls das Experiment lange genug fortgesetzt werden kann, in der Tat In- und Expirationsluft den gleichen Gehalt an Chloroformdampf aufweisen, d. h. mit anderen Worten, daß eine vollständige Abfättigung des Körpers für den betreffenden Partiardruck des Chloroformdampfes eintritt.

Überblickt man die frühere Zeit, ehe die Abfättigung eintritt, so ergibt sich Folgendes: Bei dem Versuch II der III. Gruppe wurde bereits nach einer 10 Minuten langen Einatmung von Chloroformdampf die erste Probe gezogen. Sie enthielt bereits 81 " „ Chloroformdampf der Inspirationsluft. Gewöhnlich wurden die ersten Proben nach $1\frac{1}{2}$ bis $3\frac{1}{4}$ Stunden gezogen und enthielten dann in Gruppe I Versuch I 74 " „, II 95 " „, III 90 " „, IV 93 " „, V 81 " „, VI 81 " „. In Gruppe II Versuch I 88 " „, II 85 " „, III 83 " „, IV 80 " „. Demnach ist bereits nach $3\frac{1}{4}$ Stunden eine Abfättigung des Körpers zu durchschnittlich 80—90 " „ eingetreten.

Die weiteren Proben wurden sodann in Zeiträumen von je $1\frac{1}{2}$ Stunde gezogen. Hier trat nun eine allerdings nicht sehr wesentliche Differenz zwischen Hunden und Kaninchen auf. Bei den Hunden erhält sich der erworbene Grad der Sättigung lange Zeit konstant; er betrug z. B. während $1\frac{1}{2}$ Stunden 88 " „. Bei den Kaninchen kann es vorkommen, daß ein vollkommen gesetzmäßiges langsame Steigen vorkommt, z. B. Versuch VI, Gruppe I, 81 " „; 89 " „; 96 " „; 97,3 " „; 100 " „. Andere Versuche ähneln wieder mehr den Hundeversuchen. Auch kann es vorkommen, daß ein geringes Sinken des Verhältnisses des Chloroformdampfes der In- und Expirationsluft eintritt, worauf unten noch näher eingegangen werden soll.



Überblickt man die Versuche im ganzen, so ergibt sich, daß ein sehr hoher Grad der Abfättigung (80–90 ‰) schon nach kurzer Zeit erreicht wird, daß dagegen eine vollkommene Abfättigung ein sehr langsamer binnen Stunden sich vollziehender Prozeß ist. Dies Resultat ist wohl begreiflich, da es lange Zeit erfordern wird, bis schlecht durchströmte Körperregionen mit dem Chloroformdampf der betreffenden Spannung abgefättigt sind.

Bei den bisherigen Betrachtungen wurde der Gehalt der Expirationsluft an Chloroformdampf ohne weiteres als Maß der Abfättigung des Körpers verwandt; das ist aber nicht ganz richtig. Denn die Expirationsluft setzt sich aus zwei Teilen zusammen, erstens der Bronchialluft und zweitens der Alveolarluft. Nur letztere tritt in einen Ausgleich mit dem Blute. Infolgedessen wird stets die Abfättigung des Körpers, nach der Expirationsluft berechnet, etwas zu hoch erscheinen, da eigentlich nur die Alveolarluft berechnet werden müßte. Für die Hauptresultate, nach denen ein vollkommener Ausgleich stattfindet, trifft dieser Einwurf nicht zu. Für die andern Resultate müßte eine kleine Korrektur angebracht werden, wenn man ganz genau die Abfättigung des Körpers berechnen wollte. Doch erscheint dies zunächst noch nicht von Wichtigkeit. Diese Betrachtung gibt aber Aufschluß darüber, daß die Abfättigung des Körpers gemessen an der Expirationsluft, scheinbar etwas zurückgehen kann, z. B. in Versuch V, Gruppe I von 89 ‰ auf 87 ‰, Versuch II, Gruppe II von 94 ‰ auf 92 ‰. Wird nämlich das eine mal etwas flach, das andre mal etwas tiefer geatmet, so ist der Gehalt der Expiration an Bronchialluft bald größer, bald geringer. Dieser Umstand verändert das Resultat etwas. Außerdem wäre es auch möglich, daß zeitweise schlecht vom Blut durchströmte Provinzen besser versorgt würden und daß dadurch ein Herabgehen des ihm entströmenden Venenblutes an Chloroformgehalt stattfände, was sich natürlich

im Chloroformgehalt der Expirationsluft ausdrücken würde. Beide Faktoren zusammen erklären wohl zur Genüge, daß kleine Regellofigkeiten vorkommen können.

Fasse ich nun das wesentliche Ergebnis der Arbeit kurz zusammen, so ergibt sich: Bei hinreichend langer Einatmung eines genau gestellten Chloroformdampfgemisches enthält die ausgeatmete Luft ebensoviel Chloroformdampf, als die eingeatmete, d. h. es tritt eine vollkommene Abfättigung des Körpers für den betreffenden Partiardruck des Chloroformdampfes ein.

Zum Schluß gestatte ich mir, Herrn Profeffor Dr. Geppert meinen herzlichsten Dank auszusprechen.



Erklärung der Abbildung.

Ventilator, angetrieben durch einen (nicht gezeichneten) Elektromotor.

Gasuhr, mit Wasser gefüllter Elfter'scher Präzisions-Gasmesser; mit Zahnrad rechts auf der Achse, das ein zweites Zahnrad in Bewegung setzt.

a Achse des zweiten Zahnrades, von dem sich die Schnur abwickelt, welche läuft über

b und *c* Rollen.

g Rohrverbindung.

i Regulationshahn.

Chloroformzufluss, bestehend aus

1. *e* Kreuzrohr, unten geschlossen, steht in einem Leinölbad von 125° C mit

k Thermoregulator.

2. *h* Chloroformgefäß, in das eingesetzt ist

f ein Knierohr, durch welches das Chloroform nach *e* tropft.

3. *d* Solider Stab (oder unten geschlossenes Rohr) zum Überdrücken des Chloroforms.

Blechzylinder, von 30 Liter Inhalt mit 2 Ausführungsöffnungen.

Lebenslauf.

Ich, Paul Dunker, wurde geboren am 25. November 1879 zu Hannover, besuchte dortelbst das Lyceum II, das ich Michaelis 1900 mit dem Maturitätszeugnis verließ. Ich besuchte darauf die Tierärztliche Hochschule zu Hannover, bestand dort 1902 die naturwissenschaftliche Prüfung, besuchte sodann die Tierärztlichen Hochschulen zu Stuttgart und Berlin, kehrte nach Hannover zurück und bestand dort 1904 die tierärztliche Fachprüfung. Bis zu meinem Militäreintritt am 1. Oktober 1905 war ich an verschiedenen Plätzen als Assistent und Vertreter tätig.
